

用藥指導單張

甲型交感神經受體阻斷劑

中文品名	英文品名	成分名	含量
非選擇性受體阻斷劑			
多沙賓長效錠	Dosabin XL	Doxazosin	4 mg
立安錠	DOXTER	Doxazosin	2 mg
選擇性作用在膀胱或攝護腺受體阻斷劑			
活路利淨 D 持續釋放口溶錠 (長效錠)	HARNALIDGE-D	Tamsulosin	0.2 mg
活路利淨 OCAS 持續藥效 膜衣錠(長效錠)	HARNALIDGE-OCAS	Tamsulosin	0.4 mg
優列扶膜衣錠	Urief	Silodosin	4 mg

1. 適應症：高血壓、良性前列腺肥大、排尿障礙。
2. 服用方式：請按照醫師指示定時定量服藥，不可任意增減劑量或停藥。
[長效錠] 請整粒配水吞服，勿咀嚼、剝半或磨粉。
[口溶錠] 亦可配水吞服或是置於水中崩散後服用。
3. 可能發生的副作用：虛弱、頭暈、頭痛、嗜睡、噁心、腹瀉、心悸、水腫、鼻塞、鼻炎、姿勢性低血壓、射精異常或逆行性射精。

一若有下列症狀時，請立即回診就醫：

- 1 過敏反應：皮膚紅疹、搔癢或水泡；口腔或黏膜潰瘍；喉嚨痛；眼睛紅腫、灼熱；眼睛、嘴唇腫；發燒。
- 2 嚴重頭暈或昏倒、胸痛發作或加劇。
- 3 呼吸急促、心跳不正常，手臂或腿腫脹。
- 4 勃起疼痛（陰莖硬）或勃起持續時間超過 4 小時。

注意事項：

- (1) 若有以下情況，請於服用此藥前告知醫師：曾有藥物過敏、同時服用其他藥物(包含成藥及中草藥)、患有其他疾病、懷孕或計畫懷孕或哺乳。
- (2) 對磺胺類藥品過敏者服用含有 Tamsulosin 成分的藥品可能會導致過敏，有該類過敏史者請主動告知醫(藥)師。
- (3) 服用“非選擇性”受體阻斷劑發生姿態性低血壓副作用的機率較高，為降低感到頭暈或暈眩的機會，姿勢變換時如起床或蹲下起立，請緩慢移動並小心上下樓梯。
- (4) 若有要進行白內障或其他眼科手術者，務必“事先”告知眼科醫師有在服用本類藥品。
- (5) 若忘記服藥，應於想起時立即服用；若已接近或已到下次的服藥時間，只需服用下一次藥量，絕不可一次服用雙倍藥量。
- (6) 藥品保存：藥品連同藥袋置於室溫、乾燥陰涼及兒童伸手不及之處。